



סקר לאיתור הצדפה הפולשת בנחל קישון *Mytliopsis sallei*

ליירון גורן goren.liron@gmail.com

יוני 2014


מבוא

בחודש מאי 2014 במהלך סקר חסרי חוליות שנערך בנחל קישון (אלרון וינאי, 2014) נמצאה צדפה מהסוג *Mytiliopsis*. בסוג זה כעשרה מינים, מתוכם שניים ידועים כמינים פולשים מאד ומזיקים בכל רחבי העולם. מטרת הסקר הקיימת לאתר את התפוצה של צדפה זו בנחל הקישון, ולאסוף דגימות לזהוי מולקולרי של המין באוניברסיטת תל-אביב.

שיטות וחומראים

הסקר נערך בשמונה אתרים שבהם היה מכך קשיח המאפשר התישבות צדפות (אבני, בטון, מצופים וכו') לאורך הנחל, מעגן הדיג (32°48'22.84"N, 35°1'45.36"E), ועד לבריכות נשר (32°45'33.47"N, 35°3'54.29"E), אירוי 1) וכלל גם את האתר המקורי בו נמצאה הצדפה (גשר אירי - E 34°46'18.71"N, 35°4'11.42"E). בכל אתר, המצע (אבני, חבלים מצופים וכו') הוצאו אל מחוץ למים על מנת לאתר את הצדפה. במקומות בהם לא ניתן להוציא את האבני או המצע הקשיח מחוץ למים, הצדפות חופשו על ידי מישוש של כל פני השטח עד לעומק של כ-50 ס"מ.

כ-30 צדפות שנמצאו באתר המקורי שומרו בתנול 75% והועברו לד"ר תמר פלדשטיין מאוניברסיטת תל-אביב לאנליה גנטית.




איור 1. מפת האזור שבו נערך הסקר לאיתור הצדפה הפלשתית *Mytiliopsis sallei*

תוצאות

להלן פירוט הממצאים באטריו הסקר השונים :

1. במעגן הדיג (E^o 45.36' N, 35° 1' 45.22.84' N), נעשו נסיעות לאתר את הצפה על המזחים, המצופים, החבלים והחספינות. נמצאה צמדת ים רבה הכוללת בלוטי ים בעיקר ואצלניים פולשים, אך לא נמצאו כל צדפות באיזור.
2. במעלה הזרם ממעגן הדיג (E^o 41.42' N, 35° 1' 42.21.94' N), נעשו נסיעות לאייתו הצפה על סלעים המדפינים את גאות פארק נחל הקישון. הבדיקה כללה חיפוש בתוך המים עד לעומק של כ-50 ס"מ, והפיכה של אבני קטנות והווצאתם מהמים. נמצאו בעיקר בלוטי ים, אך לא צדפות.
3. על מצוף במעלה נחל (E^o 48' 4.48" N, 35° 1' 57.05" N) נמצאו שתי קשות ריקות של צדפה הדומות במאפייניהן לקשות *Mytiliopsis*.
4. "האקליפטוס" – באתר זה, הממוקם בנ"צ E^o 29.99' N, 35° 2' 48.7.42" N, נעשה חיפוש על גבי סלעים גדולים בגודות עד לעומק של כ-50 ס"מ ועל גבי גדר שנמשתה מהמים. לא נמצאו צדפות.
5. מפגש נחלים (E^o 48' 4.50" N, 35° 2' 47.68" N) – נעשה חיפוש על גבי סלעים גדולים בגודות עד לעומק של כ-50 ס"מ. נמצאו בלוטי ים רבים, אך לא נמצאו צדפות.
6. "בזון" - (E^o 47' 26.48" N, 35° 3' 11.50" N) – נעשה חיפוש על סלעים ואבני בינויים בגדה הבוצית של הנחל. לא נמצאו צדפות.
7. באתר "גשר אירי ברכות נשר" (E^o 46' 18.71" N, 35° 4' 11.42" N) שבו אוטרה הצפה לראשונה (אלרונו וינאי, 2014) נמצאו עשרות פרטיטים מתחת לאבני (צילום 1). 50 מי' המעליה הנחל, המצע מתחלף ממצע בניי לבוצי ושם כבר לא נמצאות צדפות. במורד הנחל מהאתר קיימים סכר וגשר שעלייהם לא נמצאו צדפות כלל, ובஹמשך המים במרכז הנחל היו עמוקים מכדי לאתר בהצלחה את הצדפות, ובגdotות לא נמצאו צדפות גם על מצע אבני. יצוין, שאתר זה מהווה פחרות או יותר את הגבול שאליו הגיעו זרמי הגיאות.
8. באתר "גשר סמי אירי סמוך למחלף יגור" (E^o 45' 33.47" N, 35° 3' 54.29" N) שנמצא כתשעה ק"מ במעלה הנחל, קיימים גשר בטון היכל לשמש כמצע התישבות. למרות זאת לא נמצאו באתר צדפות. בין תחנה 7 לתחנה 8 את השטח הינו לבני בלבד, ולא אפשר התישבות של הצדפה. במעלה הנחל מאתר זה הזרימה כבר חזקה מכדי לאפשר לרوروות של הצדפה להגיע ולהתיישב.

על אף האנליזה המולקולרית (הדו"ח נשלח בנפרד על ידי ד"ר תמר פלדשטיין), הרცפים שבודדו מהצדפה שנמצאה באתר "גשר אירי", מתאימים לרצפים מהמין *Mytiliopsis sallei*. מין שמקורו במרכז ובדרום אמריקה וידוע כפולש אגרסיבי בmourח הרחוק.



צילום 1. פרט של הצדפה הפלשתית *Mytilopsis sallei* שנמצא מתחת לאבן באתר "גשר אירי" בנהר קישון בחודש יוני 2014.

דיון ומסקנות

הצדפה שנמצאה זההה כ-*Mytilopsis sallei*. זהה היא צדפה ימית קטנה שמקורה במרכז ובדרומי אמריקה. היא התפוצה במספר ארצות באיזור האינדו-פסיפי ונחשבת למזיק משמעותית בגלולתה לבסס אוכלוסיות גדולות ב מהירות ולגרום לנזקים סביבתיים וככלכליים. בישראל צדפה זו נמצאה לראשונה בשנת 2008 בנמל חיפה ובנוסף מצויהם פרטיהם באוסף המוזיאוני של אוניברסיטת תל-אביב שנאספו למרחק של 1400 מ' מהחוף. במקורה הראשון נמצאו פרטיהם בוגרים וצעיריהם על גבי גחונה של ספינת המחקר "שיקמונה" של המכון לחקר ימים ואגמים (Galil and Bogi, 2009). העובדה שנמצאו פרטיהם צעיריים ובוגרים מצבעה על קיומה של אוכלוסייה מבוססת, וסביר שהוא פלהה לאיזוריינו על גבי ספינות שהגיעו דרך תעלת סואץ (Galil and Bogi, 2009). הקירבה הגיאוגרפית של האוכלוסייה שנמצאה בקיישון לאתר שבו זההה הצדפה בפעם הראשונה בישראל (نمאל חיפה) יכולה להסביר את הופעתה בנחל. בכל מרחב התפוצה העולמי שלה הצדפה זו תהיה במים רדודים ובאזור הכרית, בטוחה ורחב של טמפרטורות (10-35°C) ומליחות 0-50 ppt). כמו כן, היא ידועה כמין עמיד לוויהום. תכונות אלו מאפשרות לה להיות מין פולש מוצלח, והן אלה שמסבירות את המזאותה של הצדפה במעלה נחל קישון היכן שהמליחות נמוכה כמעט פי 10 (4000-5000 מיקרוסימנס) מהמקום המקורי שבו הצדפה זההה בישראל (עיג ספינה בנמל חיפה).

M. sallei היא הצדפה הקטנה ומגיעת לגודל מקסימלי של 28 מ"מ. היא נמצאת לרוב על גבי מצע קשה ארכוי ובתוכו סדקאים, אבל יכולה להצמד לכל מצע קשה. היא אף יכולה להתנתק מהמצע ולהצמד מחדש במקום אחר. היא אמביו-סקסואלית – ככלומר, היא מחליפה את זוגיה בשלב מסוים בחייה. בכל נקודת זמן, חלק מסוים מהאוכלוסייה יהיה בעל איברי רביה זכריים ונקביים (הרמפורודיט). בחצי הצדור הצפוני, עונת הרבייה של הצדפה היא לרוב בין החודשים אוקטובר ודצמבר. הנקבות משחררות עשרות אלפי ביצים אל המים ושם הן עברות הפריה. הן מתפתחות לארווה ולigner חופשית ופלאגית בתוך ים, ולאחר מספר ימים ה Larva מתyiישבת. לרווה זו תלואה

בזרמים להפצתה. האוכולוסייה שנמצאה בנחל הקישון נמצאה למרחק של כשישה קילומטר משפך הנחל, במקומות בו עדין ניתן להרגיש את זרמי הגאות. סביר, שהוא לא תוכל להמשיך להתרפש במעלה הנחל, מכיוון שם הזרימה היא חזקה יותר במורם הנחל.

קצב הגדיל של *M. sallei* הוא מהיר ביותר והוא יכולה להגיע לגודל של 8-10 מ"מ כבר לאחר חודש מההתאינישבות. בשלב זה הצדפה כבר נחשבת לבוגרת מינית. היא מגיעה לגודלה המקסימלי בגיל של חצי שנה, והוא יכולה לחיות עד גיל 21 חודשים, למרות ש-12-13 חודשים זהו הגיל הנפוץ. באוכולוסייה בנחל הקישון נמצאו פרטיהם בגודלים שונים, דבר המצביע על כך שהזיהוי אוכולוסייה מבוססת שיכולה להתרבות.

M. sallei היא קרובת משפחה של צדפת הזברה (*Dreissena polymorpha*) הידועה לשמצאה שגרמה לנזקים כלכליים ואקולוגיים רבים באירופה, והיא גם דומה לה מבחינה אקולוגית: היא יכולה להצמד לכל מצח קשיח, ומכיון שהיא מתربה מהר מאד, היא יוצרת צימדות ים צפופה ביותר (בעובי של 10-15 ס"מ), דבר שmóvel לגרר גזרם בספינות, ולסתימה של צינורות (למשל של תחנות כח). בנוסף היא יכולה להתחרות במינים מקומיים על בית גידול ולדוחוק אותם.

לא ניתן לדעת מה ההשפעה האקולוגית של צדפה זאת בנחל הקישון. היא נמצאה באתרים ממוקדים מאד במעלה הנחל, באיזור שבו לא ידוע על מתחרים מקומיים (צדפות אחרות או מינים יסיבים ומסננים) שביכולתה לדוחק. עיקר המחקרים שנעשו על צדפה זו עוסקו בהשפעה הכלכלית שיש לה על בני האדם, וכן פוטנציאל הנזק הוא גדול: במידה ואוכולוסיות גדולות של הצדפה יתבססו בנחל היא תוכל להשפיע על תשתיות רבות שימוששות בנחל (מעגנים, תחנות כח, מפעלים). בנוסף האוכולוסיות בנחל יכולו להוות מקור להתרפשות לאייזוריים אחרים בחוף ישראל. יש לציין שבמעלה הנחל ישנה צדפה מהמין סליסילנית חופית שאוכולוסייתה לא גדולה מאוד (מתחת גשר כפר חסידים). במידה והצדפה המדוברת תצליח לעלות במעלה הנחל יתכן והאוכולוסיה זו תכחذ עקב התחרות.

למרות תפוצתה הרחבה, נעשו מעט מחקרים בקשר להשפעתה ולאפשרויות ההדобраה של צדפה זו. החדרה המתוعدת והמוסלחת היחידה הייתה באוסטרליה בשנת 1999 כאשר התגלתה אוכולוסiosa צפופה של צדפה זו בשלוש מרינות בעיר דרווין. שיטות הפעולה כוללה שימוש במסאות ומהירות והצלicho להשמיד את אוכולוסיות הצדפה לחלוין. שיטות הפעולה כללה שימוש במסאות אף כי סודיום היפוכלורייט ואלפי ק"ג של נחושת גופרית בשלוש המרינות במשך שלושה שבועות. הטיפול הכימי השמיד את רוב בעלי החיים במרינות, כולל את הצדפה הפלשתית. חודש וחצי לאחר הטיפול, רמת הרעליות במים ירדה והחלה התיאשבות מחדש של בעלי חיים מקומיים במרינות.

מקורות עיקריים

אלרון, א. וינאי, ז. (2014) סקר אקולוגי – נחל קישון. DHV MED. סקר עבור רשות נחל קישון.

Galil, B.S and Bogi, C.(2009) *Mytilopsis sallei* (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) established on the Mediterranean coast of Israel. Marine Biodiversity Records; 2: e73,1-4.

Global Invasive Species Database (2007) *Mytilopsis sallei*. Available from <http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1047&fr=1&sts=&lang=EN>

NIMPIS (2002). *Mytilopsis sallei* species summary. National Introduced Marine Pest Information System (Eds: Hewitt C.L., Martin R.B., Sliwa C., McEnnulty, F.R., Murphy, N.E., Jones T. & Cooper, S.). Web publication <<http://crimp.marine.csiro.au/nimpis>>, Date of access: 9/8/2004

Willen, R (2000) Outbreak of *Mytilopsis sallei* (Récluz, 1849) (Bivalvia: Dreissenidae) in Australia. Molluscan Research 20:2 25-30